



FICHAS DE CULTIVOS

EL TOMATE (*Lycopersicon esculentum*). Familia: Solanaceae

Modo de siembra: En semilleros protegidos de la intemperie.

Fecha: Entre finales de Febrero y Marzo.

Temperatura de germinación: Entorno a 25°C.

Distancia entre plantas: Lo ideal es 40x40 cm.



¿QUÉ HAY QUE TENER EN CUENTA?

Hay que **repicarlos** entorno a 10 días después de la germinación, es decir, sacarlos del semillero y ponerlos en macetas pequeñas de uno en uno. Una vez que se han terminado las heladas (y cuando midan al menos 15 cm.), es tiempo de **trasplantar** los tomates al exterior. En Madrid esto suele ser entre finales de abril y durante el mes de mayo.

CUIDADOS QUE NECESITA

Poda de los brotes axilares "chupones" (cuando todavía son pequeños). Esta tarea hay que hacerla, al menos, una vez a la semana.



Entutorado. Como son muy pesados, hay que instalar una estructura de palos (tutores) para que les sirva de soporte e ir atando su tallo y ramas a ella a medida que crecen.



Eliminar las hojas secas o enfermas. También alguna rama baja a medida que crece, para minimizar la entrada de hongos a través del suelo y favorecer su crecimiento..



Cosecha: se cosechan los tomates maduros de uno en uno y de abajo hacia arriba.

Principales plagas y enfermedades: araña roja, pulgón, oruga del tomate, mosca blanca y hongos.

Asociaciones buenas: con albahaca, caléndula, lechuga, zanahoria, cebolla o perejil.

Asociaciones malas: con patata e hinojo.

FICHAS DE CULTIVOS

EL PIMIENTO (*Capsicum annuum*). Familia: Solanaceae

Modo de siembra: En semilleros protegidos de la intemperie.

Fecha: Desde finales de Febrero.

Temperatura de germinación: Por encima de 25°C.

Distancia entre plantas: Lo ideal es 40x40 cm.



¿QUÉ HAY QUE TENER EN CUENTA?

Hay que **repicarlos** en macetas pequeñas cuando tengan 2 o 3 hojas verdaderas. Una vez se termine el riesgo de heladas, hacia finales de Abril, y cuando midan al menos 15 cm., se pueden **trasplantar** al exterior.

CUIDADOS QUE NECESITA

Hay que quitarle las flores, si las hay, antes y hasta una semana después del trasplante.



Podarle las ramas laterales por debajo de la bifurcación del tallo principal.



Quitarle la primera flor que aparece en la bifurcación del tallo principal, para favorecer el crecimiento futuro de los frutos.



Cosecha: cosechar los frutos de uno en uno, si hay muchos, mejor coger algunos, aunque sean pequeños, para permitir que el resto cojan tamaño.

Enfermedades y plagas: hongos (mildiu) y pulgones.

Asociaciones buenas: cebolla, chirivía, quisantes, zanahoria y albahaca.

Asociaciones malas: hinojo.

FICHAS DE CULTIVOS

LA BERENJENA (*Solanum melongena*). Familia: Solanaceae

Modo de siembra: En semillero protegidos de la intemperie.

Fecha: Desde principios de Marzo.

Temperatura de germinación: Entorno a 27°C.

Distancia entre plantas: Lo ideal es 40x40 cm.



¿QUÉ HAY QUE TENER EN CUENTA?

Una opción es **sembrarlas** directamente en macetas pequeñas. Si es así, no será necesario **repicarlas**, y se podrán **trasplantar** al exterior una vez que hayan terminado las heladas y la temperatura mínima no baje de 16°C.

CUIDADOS QUE NECESITA

Podar los brotes axilares "chupones" y las hojas por debajo de la ramificación principal.



Si se trasplanta a finales de Abril, **cubrir con manta térmica**.



Cortar las últimas flores antes de la primera helada del otoño para favorecer la maduración de los últimos frutos.



Cosecha: se cosechan los frutos de uno en uno. Se recomienda hacerlo antes de que pierdan el brillo.

Enfermedades y plagas: mildiu, pulgón, araña roja y escarabajo de la patata.

Asociaciones buenas: judía de mata baja, caléndula. Crecen muy bien solas.

Asociaciones malas: no se especifican.

FICHAS DE CULTIVOS

EL PEPINO (*Cucumis sativus*). Familia: Cucurbitaceae.

Modo de siembra: En semilleros protegidos de la intemperie, o directamente en suelo.

Fecha: Desde finales de Marzo en semillero, a partir de Mayo si es en suelo.

Temperatura de germinación: Por encima de 25°C.

Distancia entre plantas: Lo ideal es 50x50 cm.



¿QUÉ HAY QUE TENER EN CUENTA?

Si se **siembran** pronto puede ser en semilleros o en macetas pequeñas, y **trasplantarlos** en Mayo. Si se siembran directamente en el suelo, Mayo será, igualmente, la mejor opción. Trasplantando los plantones, la producción comenzará antes que si se siembran directamente en fechas parecidas.

CUIDADOS QUE NECESITA

Se pueden **hacer trepar por una red o tutor** para minimizar la entrada de hongos y mejorar la formación de frutos.



Hacer **tratamientos preventivos contra hongos**.



Cosechar semanalmente para estimular la producción.



Cosecha: cosechar los frutos de uno de en uno a partir de que adquieran un tamaño suficiente. Se pueden cosechar pequeños si se quieren como pepinillos.

Enfermedades y plagas: hongos y araña roja.

Asociaciones buenas: judía de mata baja, lechuga, maíz, rábano, cebolla, apio.

Asociaciones malas: tomate y patata.

FICHAS DE CULTIVOS

EL CALABACÍN (*Cucurbita pepo*). Familia: Cucurbitaceae).

Modo de siembra: En semilleros protegidos o directamente en suelo.

Fecha: Desde finales de Marzo en semillero, desde finales de Abril en suelo.

Temperatura de germinación: En torno a 25°C.

Distancia entre plantas: Lo ideal sería 100x100 cm.



¿QUÉ HAY QUE TENER EN CUENTA?

Si se **siembran** protegidos puede ser en semillero o en pequeñas macetas. En ese caso se **trasplantan** en Mayo y la producción comenzará antes. Si se prefiere crecen bien a partir de la siembra directa en el suelo. En cualquier caso, para obtener buena producción se aconseja tener al menos dos plantas.

CUIDADOS QUE NECESITA

Podar las primeras flores si la planta aun es pequeña.



Podar una hoja (la más vieja) por cada fruto cosechado y eliminar los frutos amarillentos.



Cosechar semanalmente para estimular la producción de frutos.



Cosecha: cosechar los frutos de uno en uno y antes de que alcancen un tamaño de 30 cm.

Enfermedades y plagas: hongos (Oídio).

Asociaciones buenas: judía, lechuga, maíz.

Asociaciones malas: no se especifican.